

**AGRI PES**

لزراعة وإنقاج أفضل



سنوات من العمل الجاد والمتواصل

سنوات من البحث والاعتماد على الأفضل

سنوات من الاختبارات والانتقاء للحصول على

أحدث المعدات لإنقاج أفضل المركبات فعالية وأماناً

الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس لزراعة وإنقاج أفضل

## مبادرات الصحة العامة

- 1 - كارتكس
- 2 - تانغو سائل
- 3 - تانغو بودرة
- 4 - أغري ماوس حبيبات
- 5 - أغري ماوس شمعي
- 6 - فيبرو (نمل)
- 7 - فيبرو (صراصير)
- 8 - رينج
- 9 - أغري فوغ
- 10 - برو ماوس حبيبات
- 11 - برو ماوس شمعي

Mob :

+963-960033770 / 960033771

E-mail :

info@agripes.com - sales@agripes.com

Website :

www.agripes.com - www.facebook.com/agripes

الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس

# كارتكس

## مركز قابل للإستحلاب



### خصائص المبيد :

مبيد حشري بيرثرويد شديد السمية بفعالية مديدة على الحشرات وخفيض السمية على الإنسان والحيوانات ذات الدم البارد.

فعال عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي ويقضي على حشرات الصحة العامة الطائرة كالذباب والبعوض والحشرات الزاحفة كالصرافير وبق الفراش والتمل وغيرها منخفض السمية ومتدي الرائحة ولا يترك بقايا ولذلك يستعمل بأمان في المناطق المأهولة السكنية والصناعية وفي الأماكن العامة وفي المستشفيات والفنادق والمطاعم والمستودعات ومكاتب القنامدة . نظراً لاستقراره بالضوء ومقاومته للأشعة والحرارة فإن مفعوله يدوم مدة طويلة حتى عند رشه على الأسطح المعرضة للشمس . التأثير المديد على الأسطح المرشوشة ٨ - ١٠ أسابيع .

### التركيب ونسبة المادة الفعالة :

لاميداسيهالوثرين ٢٥ غرام / ليتر .

### نسبة و طريقة الاستخدام :

حل ١٥٠ - ٢٠٠ مل من المبيد في ١٠ ليتر ماء واستخدام المزيج لرش ٢٥٠ م . أو ٨ ليتر من مبيد كارتكس لكل هكتار . توقيت الرش :

أفضل وقت للرش باكراً حتى الضحى أو بعد العصر ويفضل الرش ليلاً إذا كانت المشكلة الصراصير - بعوض - ناموس فقط .

## مبيدات الصحة العامة

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بييس





# تانغو

## سائل قابل للتعليق

### خصائص المبيد :

مبيد حشرى فعال لمكافحة حشرات الصحة العامة وهو مبيد بيرثرويدى شديد السمية بفعالية مديدة على الحشرات وخفيف السمية على الإنسان والحيوانات ذات الدم الحار .

فعال عن طريق الملامسة والجهاز الهضمى ويقضى على حشرات الصحة العامة الطائرة كالذباب والبعوض والحشرات الزاحفة كالصراصير وبق الفراش والنمل وغيرها منخفض السمية ومدى الرائحة ولا يترك بقايا ولذلك يستعمل بأمان في المناطق المأهولة السكنية والصناعية وفي الأماكن العامة وفي المستشفيات والفنادق والمطاعم والمستودعات ومقالب القمامه .

\* نظراً لاستقراره بالضوء ومقاومته للأشعة والحرارة فإن مفعوله يدوم مدة طويلة حتى عند رشه على الأسطح المعرضة للشمس .

### توقيت الرش :

أفضل وقت للرش باكراً حتى الصبح أو بعد العصر ويفضل الرش ليلاً إذا كانت المشكلة الصراصير - بعوض - ناموس فقط .

**التركيب ونسبة المادة الفعالة :** دلتاماثرين 50 غرام / لتر .

**نسبة الاستخدام :** ٢ لتر من مبيد تانغو لكل هكتار

أو بمعدل ٥٠ سـ٣ من المبيد في ١٠ لتر ماء ونكافح ما ٢٥٠ .

**طريقة الاستخدام :** رج عبوة المبيد جيداً قبل فتحها أضف ٥٠ مل إلى ١٠ لتر ماء واستخدمها لنفطية ٤٠ م .

**مضاد التسمم :** ليس له مضاد تسمم : تعالج الأعراض .

## مبيدات الصحة العامة

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس



تائغو

بودرة قابلة للبلل

خصائص الميد:

مبيد حشري بيرثرويدي شديد السمية بفعالية مديدة على الحشرات وخفيف السمية على الإنسان  
وألهانات ذات الدم الطلق.

فالملائكة حشرات العامة يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي ويقضى على حشرات الصحة العامة الطائرة كالذباب والبعوض والحشرات الزاحفة كالصراصير وبق الفراش والنمل وغيرها منخفض السمية ومتدلي الرانحة ولا يترك بقايا ولذلك يستعمل بأمان في المناطق المأهولة السكنية والصناعية وفي الأماكن العامة وفي المستشفيات والفنادق والمطاعم والمستودعات ومقابل القمامه .

ننظرً لاستقراره بالضوء و مقاومته للأشعة والحرارة فإن مفعوله يدوم مدة طويلة حق عند رشه على الأسطح المعرضة للشمس .

**التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

دلتامشرين ٥٠ غرام / كغ .

### **نسبة الاستخدام :**

٢ كغ من مبيد تانغو لكل هكتار أو بمعدل ٥٠ غرام من المبيد في ١٠ لتر ماء ونكافح بها ٢٥٠ .

#### **طريقة الاستخدام :**

حل ٥٠ غ من الميد في كمية قليلة من الماء مع التحريك الجيد ثم أكمل كمية الماء إلى ١٠ لتر واستخدام المزيج لرش ٢٥٠ م.

توقيت الرش :

أفضل وقت للرش باكراً حتى الصبح أو بعد العصر ويفضل الرش ليلاً إذا كانت المشكلة الصراصير - بعوض - ناموس فقط .

مبادرات الصحة العامة

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغلى بيس





أغري ماوس

## حبيبات على شكل طعم جاهز

خصائص الميد:

**مبيد قوارض وهو مبيد ينتمي إلى مركبات الكومارين وهو من مبيدات القوارض المضادة للتختثر .**

التركيب ونسبة المادة الفعالة: بروماديولون 0.005 %

**نسبة الاستخدام:** ٣ كغ من مبيد أغري ماوس لكل هكتار.

**طريقة الاستعمال :** توزع محتويات العبوة بشكل طعم متفرق بمسافة ٥ - ٣ متر بين الطعم والآخر قريباً من جحور القوارض وأماكن نشاطها في أماكن غير مكشوفة بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأهلية.

**مضاد التسمم : فيتامين ك .**

احتیاطات :

\* تجمع بقايا الطعوم والقوارض الميتة وتدفن في مكان مناسب .

\* لا تترك القوارض الميتة بالطعوم لكي لا تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى .

السمية:

درجة السمية LD<sub>50</sub> للجذع عن طريق الفم / ٥٠٠٠ ملغم / كغم .

و عن طريق الجلد > / ٣٥٠٠ / ملغم / كغم .

مبادرات الصحة العامة

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغلى بيس





# أغري ماوس

## مكعبات شمعية

**خصائص المبيد :**

مبيد قوارض وهو مبيد ينتمي إلى مركبات الكومارين وهو من مبيدات القوارض المضادة للتختثر .

**التركيب ونسبة المادة الفعالة :** بروماديبولون 0.005 %.

**نسبة الاستخدام :** ٣ كغ من مبيد أغري ماوس لكل هكتار .

**طريقة الاستعمال :** توزع الطعم في أماكن نشاط القوارض بمعدل ١٠٠ - ١٥٠ مكعب شمعي / هكتار .

**مضاد التسمم :** فيتامين ك .

**احتياطات :** \* تجمع بقايا الطعام والقوارض الميتة وتتدفن في مكان مناسب .

\* لا ترك القوارض الميتة بالطعوم لكي لا تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى .

**تحذيرات :** \* لا تدخن أو تشرب أو تأكل عند الاستعمال .

\* احفظ المادة في مكان بارد وجاف وعام ومهوى وضمن عبوتها الأصلية وبعيداً عن أيدي الأطفال .

\* تخلص من الأوعية الفارغة بطرmerها في حفر بعيدة عن حقول المحاصيل ومصادر المياه والبحيرات .

**السمية :** درجة السمية LD 50 للجرذ عن طريق الفم / ٥٠٠٠ / ملغ / كغ

و عن طريق الجلد > ٣٥٠٠ / ملغ / كغ .

## مبيدات الصحة العامة

إنفاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





# فيبرو

## طعم جاهز للإستعمال لمكافحة النمل

**خصائص المبيد :** فيبرو طعم متخصص لمكافحة النمل تم تصنيعه على صورة جيل يحتوي على المادة

الفعالة فيرونيل بالإضافة إلى مواد غذائية شهية وجاذبة للنمل يجعل منه الطعام المثالي لإعطاء نتائج سريعة

وملحوظة وأثر باقي طويل المدى طعم فيبرو مناسب للاستعمال كطعم موضعى وفي الشقوق والتصدعات وذلك في داخل وحول المجمعات التجارية

والزراعية وفي الأماكن الحساسة مثل المستشفيات والمدارس والفنادق وأماكن التوصيلات الكهربائية والكمبيوترات ومختلف وسائل المواصلات

( سفن وحاملات وطائرات وغيرها ) .

### طريقة الاستعمال :

فيبرو طعم للنمل معيناً في حقنة جاهزة للاستخدام بوضع الطعام على صورة نقاط أو خط في الأماكن المناسبة بجوار أماكن تجمع ومسير النمل

والمخابئ والأركان والصدوع والشقوق .

يجب مرافقه أماكن وضع الطعام وتعريض النقاط التي تم استهلاكها .

الحجم التقريبي للخط هم 4-3 سم  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ | ٥ | ٤ - ٣ سم |

## مبيدات الصحة العامة

إنفاذ الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





# فيبرو

## طعم جاهز للإستعمال لمكافحة الصراصير

**خصائص المبيد :** فيبرو طعم متخصص لمكافحة الصراصير تم تصنيعه على صورة جل يحتوي على المادة

الفعالة فيبرونيل بالإضافة إلى مواد غذائية شهية وجاذبة للصراصير تجعل منه الطعام المثالي لإعطاء نتائج سريعة

وملحوظة وأثر باقٍ طويل المدى طعم فيبرو مناسب للإستعمال كطعم موضعى وفي الشقوق والتصدعات وذلك في داخل وحول المجمعات التجارية

والزراعية وفي الأماكن الحساسة مثل المستشفيات والمدارس والفنادق وأماكن التوصيلات الكهربائية والكمبيوترات ومختلف وسائل الموصلات

( سفن وحافلات وطائرات ) وغيرها .

**طريقة الاستعمال :** فيبرو طعم للصراصير معيناً في حبة جاهزة للاستخدام بوضع الطعام على صورة نقاط في الأماكن المناسبة بجوار أماكن تجمع الصراصير والمخابي والأركان والصدوع والشقوق .

يختلف عدد النقاط في المنطقة المعاملة وذلك حسب شدة الإصابة ونوعية الصراصير .

عدد النقاط من فيبرو جل لكل متر مربع ( حجم النقطة تساوى 0.1 غ تقريباً )

يستعمل التركيز العالى في حالة الإصابة الشديدة و في الأماكن المتسخة وفي الغرف التي لا يمكن إزالة مصادر الغذاء الأخرى منها وفي حالة

وجود تجمعات الصراصير في أماكن يصعب الوصول إليها مثل الفراغات الموجودة في الجدران إن تقنية المناطق المصابة بعدد أكبر من نقاط

الطعم الصغيرة الحجم يعطي نتائج أسرع وأكثر من فعالية من تقطيعها بنقاط طعم أقل و ذات حجم أكبر .

يجب مراقبة أماكن وضع الطعام وتعريض النقاط التي تم استهلاكها .

الحجم التقريبي للنقطة :



الإصابة الشديدة	الإصابة الخفيفة
نقطتين لكل م²	نقطة واحدة لكل م²
ثلاثة نقاط لكل م²	نقطتين للأميركي
ثلاثة نقاط لكل م²	الصرسور الشرقي

## مبادرات الصحة العامة

إنفاذ الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أفري بيس





# رينج

الرش بالضباب الساخن والرش المتناهي الدقة

**خصائص المبيد :**

مبيد حشري ينتمي لمجموعة البيروفورونيدات المصنعة يستخدم بواسطة أجهزة الرش بالضباب الساخن

وأجهزة الرش المتناهي الدقة **ULV** يستعمل لمكافحة الحشرات الطائرة الضارة بالصحة العامة والناقلة للأمراض مثل البعوض والذباب بكافة أنواعه وذبابة الرمل الناقلة للايشمانيا وله أيضاً تأثير فعال على الحشرات الزاحفة المختبئة في جحورها.

رينج بخوري على الدناماثرين كمادة فعالة أساسية ومعه عامل الصنع الفوري اسيبوالثررين وعلى المادة المحفزة ببيروفونيل بوتوكسايد وهذه التركيبة تمنح مبيد رينج فعالية متميزة في القضاء على الحشرات وتحقيق نجاح كبير لبرامج المكافحة.

**المركب ونسبة المادة الفعالة :** كل لتر من مبيد رينج بخوري على : دناماثرين 20 غ - اسيبوالثررين 10 غ - بيروفونيل بوتوكسايد 150 غ .  
نسبة الماء المستحضر رينج : عن طريق الفم لأنثى الجرذ 4600 ملخ/كع . عن طريق الجلد للأرنب 2800 ملخ/كع .

**السمية للطوطور والأسماك :** سام للتحل - متوسط السمية للطيور - سام للأسماك .

يستخدم مبيد رينج بعد حله بالمذيبات العضوية ( مازوت أو كيروسين ) حسب النسب المقصورة مما وهو غير قابل للانحلال بالماء .

يستخدم بواسطة أجهزة رش الضباب الساخن وأجهزة **ULV**

**معدل الاستخدام حسب الجدول التالي :**

نوع الرش	نسبة المزج	نسبة محلول الرش	معدل استخدام المبيد
ضباب ساخن	١ لتر مبيد + ١٩٩٠ لتر مازوت أو كيروسين	٥ لتر / هكتار	٢٥ مل / هكتار
ULV	١ لتر مبيد + ١٩ لتر مازوت أو كيروسين	٥٠ لتر / هكتار	٢٥ مل / هكتار

## مبيدات الصحة العامة

إنفاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





# أغري فوغ

الرش المتناهي الصغر و الرش بالتضبيب الحراري

**خصائص المبيد :** مبيد حشري للرش الضبابي الساخن والـ **ULV** مخصص لأغراض الصحة العامة  
فعالية عالية بفضل المادة الفعالة لاميداسيهالوثرين وعامل الصرع الفورى تترامثرين .

\* آمن الاستخدام ومنصوح باستخدامه من **WHO** . \* الضباب سريع الانتشار والاختراق في الجو . \* درجة ثبات عالية تجاه الحرارة والضوء .  
\* كمية قليلة من المستحضر تغطي مساحة كبيرة .

**التركيب :** لاميداسيهالوثرين ٢ % + تترامثرين ٤ % + بيبرونيل بتوكسايد ٦ %. **مواد حاملة :** مذيب عضوي - مواد مساعدة .  
**في الرش الضبابي الداخلي :**

\* إبعاد السكان والحيوانات والطيور عن أماكن الرش . \* تنطيط أدوات وأواني الطعام والماء . \* فصل الكهرباء وإطفاء أدوات التسخين الحراري .  
\* إغلاق الأبواب والنوافذ قبل الرش ولدنة 30 دقيقة بعده .

**في الرش الخارجي :** لا ترش أثناء هطول الأمطار ولا في سرعة رياح أكثر من 15 كم / س ولا في درجات الحرارة العالية تجاه ماسورة جهاز  
الضباب يجب أن يكون أفقياً تجاه سير العربة يجب أن يكون معاكساً لاتجاه الريح .

**الاستخدام :** الناقلة للإيشمانيا والبعوض الناقل للمalaria في المناطق المفتوحة والمغلقة لمكافحة الحشرات المنزلية الطائر ذباب متز - بعض - دبابير  
يستخدم للرش الضبابي الساخن أو **ULV** بواسطة أجهزة رش محمولة بآيد أو على عربات للعرض ويتم استخدام مبيد أغري فوغ  
حسب الجدول التالي :

معدل الاستخدام	الكمية اللازمة لرش ١ هكتار	معدل المزج	نوع الرش
٢٥ مل مبيد / هكتار	٢ لتر من محلول الرش	١٢,٥ مل مبيد / ١ لتر كيروسين أو ديزيل	ضباب بارد أو <b>ULV</b>
٢٥ مل مبيد / هكتار	٥ لتر من محلول الرش	٥ مل مبيد / ١ لتر كيروسين أو ديزيل	ضباب ساخن

## مبيدات الصحة العامة

إنفاذ الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





# بروماوس

**حببيات على شكل طعم جاهز**

**خصائص المبيد :**

مبيد قوارض ينتمي إلى مركبات الكومنارين وهو من مبيدات القوارض المضادة للتختثر.

**التركيب ونسبة المادة الفعالة :** بروديفاكوم 0.005 %.

**نسبة الاستخدام :** ٣ كغ من المبيد لكل هكتار.

**طريقة الاستعمال :**

توزيع محتويات العبوة بشكل طعم متفرقة بمسافة ٣ - ٥ متر بين الطعم والأخر قرباً من جحور القوارض وأماكن نشاطها في أماكن غير مكشوفة بعيداً عن الأطفال والحيوانات الأهلية.

**مضاد التسمم :** فيتامين ك.

**احتياطات :**

\* تجمع بقايا الطعام والقوارض الميتة وتدفن في مكان مناسب.

\* لا ترك القوارض الميتة بالطعام لكي لا تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى.

**السمية والإسعافات الأولية :**

درجة السمية LD 50 للجذذ عن طريق الفم / ٥٤٠٠ / ملغ / كغ

**مبيدات الصحة العامة**

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس





# بروماوس

## مكعبات شمعية

**خصائص المبيد :**

مبيد قوارض ينتمي إلى مركبات الكومارين وهو من مبيدات القوارض المضادة للتختثر .

**التركيب ونسبة المادة الفعالة :**

بروديفاكروم % 0.005 .

**نسبة الاستخدام :** ٣ كغ من المبيد لكل هكتار .

**طريقة الاستعمال :**

يمكن وضع الطعم الشمعية في الأماكن الرطبة كما يمكن ربطها بشريط واسقاطها في نقاط الصرف الصحي .

**مضاد التسمم :** فيتامين ك .

**احتياطات :**

\* تجمع بقايا الطعم والقوارض الميتة وتدفن في مكان مناسب .

\* لا ترك القوارض الميتة بالطعم لكي لا تأكلها الطيور والحيوانات الأخرى .

**السمية والإسعافات الأولية :**

درجة السمية LD 50 للجذذ عن طريق الفم / ٥٤٠٠ ملغ / كغ

## مبيدات الصحة العامة

إنتاج الشركة الحديثة لوقاية المزروعات أغري بيس

